
DISSERTATIO MEDICA

INAUGURALIS,

DE

GONORRHOEA VIRULENTA.

DISSERTATIO MEDICA INAUGURALIS,

DE

GONORRHOEA VIRULENTA;

QUAM,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

Ex Auctoritate Reverendi admodum Viri,

D. GEORGII BAIRD, S. S. T. P.

ACADEMIAE EDINBURGENAE PRAEFECTI;

NECNON

Amplissimi SENATUS ACADEMICI Consensu,

Et Nobilissimae FACULTATIS MEDICAE Decreto;

PRO

GRADU DOCTORIS,

SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS;

ERUDITORUM EXAMINI SUBJICIT

ARTHURUS BROOKE FAULKNER, A. B.

TRIN. COLL. DUB.

HIBERNUS;

AD DIEM 12 SEPTEMBRIS, HORA LOCOQUE SOLITIS.

Tristius haud ullum monstrum, nec saevior ulla
Pestis, et ira Deum *Stygiis sese extulit undis.*

VIRG.

EDINBURGI:

CUM PRIVILEGIO,

APUD ROBERTUM ALLAN,


MDCCCIII.

VIRO HONORABILI
ROBERTO CULLEN,
SUPREMÆ APUD SCOTOS CURIÆ, IN CIVILIBUS
NECNON IN CRIMINALIBUS
SENATORI,

HÆC paucula, Vir Spectatissime, studiorum primitias et animi in perpetuum grati perexile pignus accipias quæso. Quantam honorem mihi arrogo hasce paginas viro artibus liberalibus doctissimo, et ingenio, integritate et suavitate morum ornatissimo dicasse minime me latet; cujus amicitia et conciliorum præ omnibus memoriam, semper dum mihi vita restaverit gratissime fovebo: liceat mihi igitur, hoc libellum tibi sacrum velle, ut ita saltem pateat quam sim, semperque futurus sim sincero grati animi affectu, et pleno observantia obsequio tibi addictus et devotus.

Necnon, liceat mihi, hoc testimonium amicitia et amoris fratri meo HUGONI FAULKNER, Armigero, consecrare, cujus exemplum et virtutes semper erit in votis imitare.

A. B. FAULKNER.



Digitized by the Internet Archive
in 2020 with funding from
Wellcome Library

<https://archive.org/details/b31967528>

E R R A T A.

Pag. 8, lin. 7, *pro* Gonorrhœa *lege* Gonorrhœam.
— 15, — 8, — aëre — alio.
— — — — — producitur — inducitur
— 16, — 13, — hac — hæc.
19, — glandulis — glandi.
— penes — penis.

DISSERTATIO MEDICA

INAUGURALIS,

DE

GONORRHOEA

VIRULENTA.

A. B. FAULKNER AUCTORE.

CUM medici peritissimi hanc rem tam ingeniosè tractaverunt, et tam multi libri de eadem in lucem editi sunt, nequaquam in mentem provenit aliquid novi proferre, vel caliginem quæ rem obtegit, minimâ parte dimovere; meum tamen est thesin inauguralem edere, et hoc munere fungi conabor.

DEFINITIO MORBI.

VERBIS sequentibus morbus a Dre. CULLEN definitur—“ GO ORRHOEA, in qua post concubitu-
 “ tum impurum humor puriformis cum dysuria ex
 “ urethra profluit.” Hæc species Gonorrhœæ syphiliticæ vel malignæ nomina adeptæ est: hic observare liceat nomen Gonorrhœæ huic morbo fatis ineptè tum mihi tum aliis impositum esse constare, cum non sit fluxus feminis qui morbum designat, ut derivatio nominis suggerit, sed notionem falsam antiquorum exprimit, qui in sede morbi parum vel omnino non versati erant: quare si nomine Græco uti necesse sit, ut naturam hujus affectionis exprimat, idem fert animus imponere nomen, ac Cel. SWEDIAUR, et morbum “ Blennorrhagiam” nuncupare, cum, ut supra dixi, non sit fluxus feminis, sed humoris puriformis ex membrana interna urethræ secreti, qui morbi intimam naturam constituit:

tuit : melius impositum esse mihi videtur nomen Gonorrhœæ, huic speciei morbi quæ dormientibus accidit, et quæ exinde haud ineptè Gonorrhœa dormientium appellatur. Veniam posco pro hac aberratione ; tamen cum terminis cujusvis disceptationis notionem certam et accuratam affigere necesse sit (ut nil ambiguum oriatur), hanc veniam concessam mihi futuram esse spero : nunc ad rem progredior.

HISTORIA MORBI.

GONORRHOEA virulenta variis temporibus post coitum sese manifestat ; sæpe inter diem secundam et quintam, aliquando tamen multò feriùs : alii aliis temporibus multò magis opportuni sunt infectioni, dum etiam sunt qui omnino non obnoxii esse videntur. Eodem modo ac alii morbi, ut rubeola, variola, typhus, &c. &c. in aliquos valere non possunt, quamvis multum contagioni expositi sint, dum inter alios facillime grassantur : imo etiam idem diversis temporibus dissimiliter infectioni Gonorrhœæ opportunus est, et morbo proclivitas repetitione maxime augetur, ut satis bene experientia in dies testatur. Morbus modo sequente plerumque semet ostendit : æger paucis diebus post concubitum impurum, modò citiùs, modò feriùs, sensum gratum
vel

vel pruritus insolitus, per totum canalem uriniferum vel ejus maximam partem, potissimum verò circa ostium urethræ, percipit. Os urethræ solito aper-
tius fit, glans penis tumida et tensa; motus oscillatorius testium adauctus est, et nunc æger præ-
ter consuetudinem in venerem proclivis fit: extre-
mitas ostii urethræ, si accuratè inspicitur, ali-
quantò inflammatione affici videtur, atque inter-
mingendum dolor sæpe maximè urgens ægrum vex-
at; humor plerumque limpidus vel coloris subfusci
pressurâ adhibitâ, effunditur; morbo progrediente,
dolor per urethram tandem percipi incipit, ac de-
mum tam acutè sentitur, ut ferè intolerandus fit,
potissimum inter guttas urinæ ultimas reddendas:
hæc sensatio dolens “Ardor Urinæ” audit,
quæ aquæ bullientis sensum bene referre dicitur;
sanguis etiam aliquando urinæ admiscetur: brevi
humor ex urethrâ secretus diversum colorem, fla-
vum vel subviridem, vel sanguine tinctum exhibet,
et quantitate multum augetur; fit etiam tenuior
et copiosior; et haud rarò partes subjacentes ero-
dit, hoc modo ardor urinæ adhuc magis intensus
evadit,

evadit, atque adeò pungens ut urinam reddere maxime reformidet æger: his sæpius succedunt tentigo, phymosis, paraphymosis et non rarò bubones sympathetici, quæ omnia dolorem excruciantem ad extremum augent, adeo ut vita pro morte feliciter mutata videretur, nec die remissione brevissimâ reficiatur, nec nocte ullo ferè somno recreatur æger: priapismus intolerabilis ægrum excruciat, et si ullo casu somnus sese obtulerit, propitium et obrepentem dispellit: jam morbus acmen attigit, tempus vero quo hoc accidit pro rebus multùm variatur; scil. pro constitutione, habitû corporis, temperamento, regimine, methodo medendi, &c. Tempus etiam durationis horum signorum paritèr incertum est; per dies octo vel decem plerumque perstant, sæpe citiùs remittunt, ferè semper si inflammatio urethræ regimine idoneo sedulè evitetur, morbus sponte decrescit, symptomata gradatim evanescent, profluvium crassius fit, et coloris albidus, ac demum omnino cessat.— (CULL. Vol. IV. p. 387.)— Cum fit inflammatio membranæ mucosæ urethræ quæ naturam intimam morbi

morbi constituit, sic cum ejus remissione morbus ipse mitescit, et alia proinde symptomata minus dolentia evadunt.

Hoc modo phœnomena solita Gonorrhœa sese plerumque ostendunt et terminant; longe aliter autem res nonnunquam sese habet, ac secum multo magis periculi fert, scil. perinæum, et testiculi, ac lacunæ etiam MORGAGNI inflammatione afficiuntur; quæ aliquando in suppurationem abit; inflammatio ulterius prorepens cervicem vesicæ etiam ac glandulam prostaticam et chordam spermaticam occupat, hinc urinæ suppressio vel incontinentia, testium tumor, &c. Ureteres una cum vesicâ aliquando afficiuntur, et inflammatio ad renes ipsos ascendit, rarissimè tamen omnia hæc signa infausta in eodem ægroto observantur sub eodem insultu; sæpius profluvium ex urethra cum ardore urinæ ægrum tantum vexat, formam adhuc mitiorem aliquando et induit morbus, sed hoc rarò. Sub his formis mitioribus diæta parca sine ullo alio remedio evanescit.

In mulieribus signa propemodum eadem sunt vel mitiora, et simili modo tractanda; morbus tamen non semper æque feliciter exit; aliquando magna debilitas partium succedit, et fluxus mucii ex urethra pellucidus et tenax et instar feminis virilis in longum producitur; hæc morbi sequela Angl. "Gleet" appellatur, et Gonorrhœa imperitè tractatam vel violentam sæpissimè comitatur. Hæc affectio sæpe plures annos nullis remediis sananda persistat, et semper facillimè exasperatur exercitatione quavis præcipuè venere nimis cultâ, vel potûs excessu. Inter duas species hujus affectionis maximi momenti erit discrimen facere; nam curatio ex toto variatur prout ab exulceratione vel relaxatione merâ urethræ oriatur; in priore casu sedem exulcerationis cognoscere nos æquè oportet, ut de prognosi judicium ullâ fiduciâ faciamus, nam periculum fit magis imminens prout exulceratio altius per canalem urethræ prorepat. Hæc morbi sequela hydrargyro tantùm cedit, sicut lues ipsa; altera relaxatione merâ exoriens remedia topica plerumque solummodo exposcit.

Gonorrhœæ

Gonorrhœæ imperitè tractatæ sæpe succedunt epididymis durities, fistulæ perinæi, tumores urethræ verrucosi, bubones et emissiones feminis involuntariæ, stricturæ urethræ, &c. Ex quibusdam horum infelicissimus æger raro omnino immunis evadit. Alios effectus, sequelas Gonorrhœæ Virulentæ si ad rem pertineret, subjungere possemus; hæc autem jamjam tradita, præcipua esse nobis videntur.

B

CAUSÆ

CAUSÆ REMOTÆ.

Causa occasionalis Gonorrhœæ malignæ, est mucus acris e vagina in urethram introductus unde morbus excitatur, stimulo urethræ applicato. Sunt qui affirmant virum a vasis lymphaticis penis absorberi, et per ea in urethram depositum, si hac ratio fuisset qua virus ad urethram devehetur, Gonorrhœa semper observata fuisset, sub insultu, tum alte in urethra, tum sub fræno collocata; hoc forsan rarissime vel nunquam sese sic habet*.

De Causa Prædisponente,—Nil fere pro certo dicere possumus; forsitan clima, tempestas, ætas, habitudo corporis, et idiosyncrasis, ut in aliis, sic in hoc morbo, inter causas prædisponentes haberentur. Investigatio hujus, ingeniosis seposita est.

DE

* Vide SWEDIAUR, p. 25.

DE CAUSA PROXIMA MORBI,
ET NATURA VIRI.

INTER medicos diu existimatum fuit, profluvium Gonorrhœæ malignæ ab exulceratione urethræ provenisse : rem quidem interdum ita se habere, parum nego, ulcera vero rarissime subesse compertum habeo ; hanc opinionem nostram satis corroborant dissectiones cadaverum horum, scilicet, qui morbi violentiæ vitam suam tradiderunt, in quibus nulla ulcera detecta fuerunt. Hoc etiam vim accipit ex eo, quod ulcera in labiis vaginæ fœminarum rarissime conspiciuntur. Morbus nil nobis esse videtur præter fluxum mucis in lacunis urethræ inordinate secreti quantitate, colore, et spissitudine mutati, pro ratione stimuli acrimoniæ ; hoc naturam morbi proximam constituere opinor. Eodem modo ac alia stimulantia, excretionem in aliis partibus corporis augent, ut stimu-

lantia naribus, vomitoria ventriculo, purgantia in testinis admota, &c. sic virus, Gonorrhœam excitare habeo. Hinc rationem adhibere possum quantitatis profluvii in Gonorrhœa Virulenta si autem secundum opinionem medicorum olim, fluxus, vel feminis virilis, vel etiam puris fuerit, nemo, tam bonæ constitutionis, vel utcunque patiens ægritudinis, diu sustinere potuit: hic fluxus igitur stillicididum muci *puriformis* haud inepte, appellari videtur. Ope hujus muci largiter secreti, partes urethræ internæ defenduntur ab exulceratione, vel viro per canalem urini-ferum altius extendente, sed si ullo casu deficiat hic mucus, ulcera progignuntur, nempe quia virus obvolvi non potest, sic etiam (propter defectum muci scilicet) ulcera partium penis externarum, viz. glandis, et præputii inducuntur, sic lues ipsa progignitur; igitur has duas affectiones, luem, et Gonorrhœam Virulentam ejusdem infectionis solummodo modificationes opinor:

Argumenta horum, qui opinionem contrariam
tenent,

tenent, his sequentibus forsan comprehendi possunt.

1mo,—Venenum Gonorrhœæ Virulentæ, symptomata syphilitica nunquam inducet.

2do,—Acrimonia Gonorrhœæ, ulcera, Anglice “Chancres” dicta, nunquam ciet, vel vice versa.

3tio,—Curatio Gonorrhœæ hydrargyri ope nunquam promovetur, sed quævis Gonorrhœa sine hydrargyro et sine ullo morbi reditûs periculo, fanari potest.

Has opiniones infra refellere nitendum est. Luem non semper Gonorrhœæ sequelam esse explicatû parum difficile videtur; nam si Gonorrhœa non vel admodum violenta vel imperite tractata sit, inflammationem urethræ solummodo ciet, nulla exulceratione facta, quâ virus resorbi potest; mucus membranæ internæ urethræ largiter secretus, virus recondit vel abluit; urina, etiam canalem
urini-

uriniferum abstergens, huic ablutioni haud parum confert: si vero Gonorrhœa vel imperite tractata fit, vel propter violentiam, partes aliquas erodit, venenum in systema reforbetur, ulcera et lues ipsa producuntur*.

Quando etiam virus admovetur corporis partibus, quæ talibus glandulis, ut in urethra, instructa non sint, quæque nulla secretionem colluuntur, venenum

* De hoc, verba Cel. SWEDIAUR, subjungere ut rem melius intelligamus convenit.—

“ I have seen claps (says he) through injudicious
 “ treatment, or where the disease had been originally accom-
 “ panied with an ulcer of the urethra, followed by the most
 “ unequivocal symptoms of lues itself.”—(And again in another place)—“ It is certain, that when Gonorrhœa is accompanied with an ulcer of the urethra, the parts are then disposed to an absorption of the virus; in these circumstances, I never met with a single case, where this absorption did not take place; and if early recourse was not had to Mercury, the lues most certainly was produced. I have also met with several cases (says he) where, from the accidental wounding of a small blood vessel in the urethra, by the unskilful application of the syringe, or catheter, the virus of a simple clap has been absorbed, and produced unequivocal venereal symptoms in the system.”

nenum venis lymphaticis resorbetur, et in systema devectum, luem excitat, hinc ulcera glandis penis et præputii, hinc etiam ulcera venerea nasi, et palpebrarum, tactu manuum scilicet, veneno oblinitorum exorientia. Nemo forsan negabit, quin virus ulcerum venereorum urethræ applicatum Gonorrhœam excitaret, cum hæc tam facile quovis aëre stimulo producitur *. — Quoad tertiam opinionem, viz. quod curatio Gonorrhœæ hydrargyri ope nunquam promovetur, error ab hoc oritur, nempe, quod natura sæpius curationem ipsa efficit, viz. cum nulla sit absorptio viri; in his casibus mitioribus, virus denique exputum est, in secretionem mucosam urethræ involutum; sed quando excoriatio vel exulceratio urethræ virus absorbere partes opportunas reddit, nil amplius extra circulationem manet virus, nec ejicitur, sed in systema absorptum luem difeminat, nullo alio remedio præter hydrargyrum cessuram :

* Vide SWEDIAUR de Gonorrhœa, p. 37, ubi experimenta in seipsum instituta narrat.

cessuram : cum, in casu priori, nulla sit viri absorptio, parum usui inserviit hydrargyrus, nam extra decursum ejus est morbus; hinc forsan orta fuit opinio ejus inutilitatis in omni casu, quare primi momenti erit inter has duas species Gonorrhœæ distinguere, cum singula earum, remedia diversa et ex toto a sese differentia, etiam ac si morbus generis diversi fuerit exposcat. Ab omnibus his præmissis vix ac ne vix dubitare possum quin ab eadem contagione pendere luem et Gonorrhœam Virulentam quod tamen multa sunt argumenta hisce opposita et aliis viris ingeniosis adducta parum ignoro : cum hac e contra perpendam, animus iterum negare quod antea probare proposui me inducet; liceat interrogare, Ubi latet virus post coitum impurum quando Gonorrhœa Virulenta solummodo oritur? Aliquis mihi forsan respondeat, In cavitate urethræ, quare non æque glandulis penes adhæret, virus nulla ablutione amovendum, et quare Gonorrhœam Virulentam non semper vel plerumque committatur,

mitatur, nam virus partibus externis æque ac internis applicari, nemo negare potest; si fit obiectum absorbentia glandis penis non semper ad sua munera apta esse, hoc explicationem potius quam affirmationem meram exposcere videtur. Hic atra caligo rem obtegit, et quamvis opinionem contagionis identitatis adoptavi, rationi parum omnino congruentem sese offerre confitendum est; sic rem ut inveni relinquo experientiâ accuratius observantium determinandam,

Quod sunt argumenta ex testimoniis historicis illata, quæ opinionem nostram subvertere videntur, parum ignoro, viz. quod lues in Europam haud ante annum 1493 sese ostendit, Gonorrhœa Virulenta autem non nisi quadragenis annis postea elapsis ibidem innotuit: Argumentis tamen ex testimoniis historicis rebus factis et experientiæ repugnantibus, nulla fides habenda est. Alia desunt argumenta litem componere; nos rem in medio relinquimus.

RATIO SYMPTOMATUM.

ARDOR URINÆ.—EX viro urethræ inflammationem excitante exoritur; hinc partes affectæ præter ordinem sensiles evadunt, et acrimoniâ urinæ potissimum læduntur, aliæ partes etiam urethræ, (si inflammatio altius extenderet), abraduntur, ac demum cervix ipsius vesicæ affectionibus dolentissimis afficitur; scilicet *Ischuriâ* et *Stranguriâ*—harum causæ proximæ variæ sunt, prout causæ excitantes variantur, viz. 1^{mo}, est Inflammatio vel contractio spasmodica vesicæ cervicis, Gonorrhœâ retropulsâ exoriens. Vel 2^{do}, est Compressio vesicæ, vel urethræ, quâ fere vel omnino clauduntur, ex tumore glandulæ prostaticæ vel partium vicinarum proveniens. Vel 3^{tio}, denique ischuria vel stranguria oriuntur ex cicatrice vel carunculo fungoso in aliqua parte urethræ;

hujus

hujus speciei affectionis curatio difficillima est, fere semper medici peritiam frustrans.

Tumor testium.—Secundum aliquos sympathiâ partium exoritur, alii ad absorptionem referunt, dum etiam sunt qui inflammationem tarde extendentem ad vesicæ cervicem et cursum feminis cohibentem, hujus signi infausti causam esse tenent; nullâ tamen harum rationum culpâ immunis est; ab omnibus fere nunc conceditur, tumorem testium non ex absorptione viri vel sympathia provenire, sed acrimoniâ veneni altius in urethram translati, ubi ductos excretorios vasorum feminis virus irritat et hinc excretio feminis cohibetur, vasis ipsis contractis et tumore affectis; hinc etiam feminis accumulatio primo in vase deferente, tum in epididyme, et postremo in testiculo ipso; virus vasa spermatica irritans, si non amotum sit, suppurationem, et callositatem denique inducere solet.

DIAGNOSIS.

MORBI præcipui quibuscum Gonorrhœa Virulenta confundi potest, sunt Gonorrhœa Benigna, Leucorrhœa, Affectiones Renum, et Vesicæ Uriniferæ, de quibus paucula in ordine ut dignoscantur, dicere propono.

Gonorrhœa Benigna—Ab hac facillime distinguitur *Gonorrhœa Virulenta*.—*1mo*, Quantitate fluxus majore et acriori, et profluvio ipso contagione communicato.—*2do*, Causis excitantibus omnino diversis, viz. quæ *Gonorrhœam Benignam* cient, nempe debilitas, laxitas solidorum, venus immodica, *Gonorrhœam Virulentam* nunquam ciere valent; vel breviter, *Gonorrhœa Vi-*
lenta

rulenta a Gonorrhœa Benigna internoscitur, ostii urethræ turgitate, et dilatatione, dysuriâ et plerumque fluxus natura et colore, tentigine et ad metastasin proclivitate. *Leucorrhœa*. Inter hanc et Gonorrhœam Virulentam sæpe difficile est discriminare; sequentia præcipua sunt diagnostica, viz. in fluore albo fluxus est plerumque copiosior in dato tempore, et circa tempus quo menses fluere solent magis infestat, et copiosior effunditur; mulieres leucorrhœa afflictæ habitum corporis debiliorem quam in Gonorrhœa observatur habent, præterea doloribus dorsi et lumborum magis vexantur.

Affectiones Renum.—Hæ facillime internoscuntur dolore calore et ponderis sensu cum aliis inflammationis signis in regione renum, fluxum semper precedentibus; hac autem symptomata febrilia Gonorrhœam Virulentam nunquam comitantur, vel antecedunt, rarò etiam per morbi decursum notatu digna

DE GONORRHOEA.

digna sunt, nisi inflammatio urethrae maxime dolens et excrucians evaserit.

Affectiones Vesicae Uriniferae.—Dolor circa partem abdominis inferiorem, et in regione vesicae, has affectiones plerumque notat, praeterea in vesicae urinae affectionibus, profluvium humoris raro apparet nisi cum urina dum reditur.

PROPHYLAXIS.

PROPHYLAXIS.

DE PROPHYLAXE parum pro certo aliquid dicere possumus, cum quævis cautio tam sæpe inefficax sit morbum prævenire, hoc autem consilio methoda varia sese offerunt, viz. Alkali causticum ut mucii proprium solvens, a Doct. FORDYCE commendatur partes post coitum detergere, et eodem consilio alii, solutionem muriatis hydrargyri corrosivi adhibent; hac tamen inflammationem aggravantia, non semper sine periculo administrantur; sapo communis ut minus acrior consilio prophylaxis multo magis commode respondet, ut Doct. DUNCAN, in Prælectionibus suis, de Natura Muci tractans, observat: Omnia prophylactica tamen plorandum est, spes nostras sæpissime frustrare et forsan in longum frustrabunt, ut si supplicium fuerit nobis DEO inflictum, justum peccatorum præmium.

P R O G N O S I S.

SI in membrana urethrae mucosa situs fit morbus, vix ac ne vix tecum ullum periculum trahit, et in paucis diebus fere semper sanatur; sed si partes magis internas, ut glandulas COWPERI, vesicam, vel glandulam prostaticam occupat, nil fere pro certo de tempore morbi durationis, statuere possumus; praeterea duratio pro constitutione aegrotantis, multum variabit.

C U R A T I O

CURATIO MORBI.

GONORRHOEAM nullis adhibitis remediis sæpe sponte discessuram esse in dies experientia docet, sed sæpius formam magis complexam induit morbus, quo circa medici attentionem magis sollicitat. Imprimis de injectionibus tractare propono.

Injectiones.—Harum exhibitio pro morbi stadio multum variatur, viz, in *primo* stadio cum inflammatio membranæ mucosæ urethræ, solummodo ægrum vexat, injectiones astringentes curationem ipsæ plerumque efficient, sed cum glandulæ tumore et inflammatione afficiuntur, ut in *secundo* et *tertio* morbi stadio, harum usus multum periculi secum trahit.

In stadio morbi *primo*, nil præter tumorem unius vel amborum testium, nos deterreret, quin

ad usum immediatum et diligentem injectionum astringentium, decurramus ; hic observare liceat, praxi medicorum olim, qui injectiones emollientes, in hoc morbi stadio adhibere soliti fuerunt, parum fidendum est ; nam partes relaxant et profluvium protrahunt. Injectionum astringentium variæ sunt formulæ, sed omnium hac infra mihi optima esse videtur.

R. ceruss. acetat. ℞j
 dissolve in ℥ijss. aquæ
 grs. xv. Sulph. Zinci
 dissolve in ℥ij fs. aq.
 misce et injiciatur
 acetis Zinci.

In stadio morbi *secundo*, cum penis corpus ex toto dolens sit, priapismus excrucians, et glandulæ COWPERI tumore et inflammatione afficiuntur, vel in tertio cum glandula prostatica tumefacta, et præter modum irritabilis evadit, vel in quarto,

cum

cum vesica ipsa inflammatione occupatur, in omnibus his, injectiones astringentes rejici debent, ut fluxum impediunt, et harum in loco emollientes, ut fluxum promoveant, et acrimoniam viri obtundant, administrare præstabit; hoc consilio, oleum tepidum vel aliæ injectiones emollientes, in urethram sunt injiciendæ, vel si dolor maxime urget, opium per anum injicere conveniet.

Ne inflammatio perinæi, vel glandulæ COWPERI, in suppurationem abeat, nobis diligentissime præcavere oportet, hoc consilio, sanguis copiose mitti debet, regimen antiphlogisticum stricte est administrandum, lâxantia, emollientia, et applicationes sedativæ partibus impositæ, sunt adhibendæ; si vero tumor in suppurationem abeat, fomenta, et emollientia, ut naturam adjuvemus, et suppurationem promoveamus, admoveere præstabit, et denique tumorem incidere, ne in urethram erumperet, et morbus fiat insanabilis.

Præter abscessus glandularum, sæpe et alii in corpore cavernoso, ac spongioso urethræ gigni solent; de horum tractatione, ad systemata chirurgiæ lectorem referam.

In stadio morbi *tertio*, cum glandula proflata sit morbi sedes, sanguis immediate detrahendus est, pro constitutione et ægri viribus, fonticuli etiam ex utroque latere raphæ perinæi, multum prodesse solent, et clysmata ex opio, irritationem et dolorem ut compeſcant, jure adhibentur, viz. Guttæ xxx. laudani liquidi, et ℥ij. Amyl. tenuis doloris remissionem plerumque cito præbent, et præterea tenesimum miigant. Diluentia blanda ut infusiones althææ, vel feminum lini, acrimoniæ profluvii obtundendæ, optime inserviunt. Laxantia in hoc, æque ac in quarto morbi stadio, debent esse lenia, propter irritationem quam ciere solent. Tumor glandulæ prostatæ vix ac ne vix in suppurationem abit, sed quando venæsectioni non cedit, vel gradatim subsidet, in schirrum postremo sæpe definit;

hujus

hujus sequela Anglice “Gleet” appellatur, et nullis fere remediis sanandum. Aliquando meatus uriniferus, ex toto clausus est, et hinc necessitas vesicæ incisionis, ut urina redderetur, et ne morte erripiatur æger.

In stadio morbi *ultimo*, eventus non æque timendus est ac in hoc jamjam tradito, sed eadem fere remedia sunt usurpanda; hac omnia consilio irritationem compescendi, sub initio morbi administranda sunt, et votis nostris plerumque respondent; cum vero morbus progreditur et dolor minus acutus evadit, irritatione tamen adhuc manente, et profluvio materie viscidæ comitante, venæsectio, et hac alia remedia antea memorata parum usui inferviunt; in hoc morbi statu, cinchona officinalis, et olea terebinthina indicantur: horum doses solito majores, ventriculi statui solummodo accommodatæ, sunt exhibendæ.

Quod diætam attinet, semper tenuis esse debet,
dum

dum ægrum inflammatio vexat ; sed, morbo progrediente, cum debilitas magna inducitur diæta debet esse generosior.

FINIS.

